

BAB V

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab merokok pada siswa SMK PUI kota Cirebon rata-rata mencapai 74,32% (sebagian besar). Walaupun demikian masih ada siswa yang merokok bukan karena faktor-faktor tersebut, tetapi karena faktor lain.
2. Kemauan berhenti merokok pada siswa SMK PUI kota Cirebon rata-rata mencapai 94,51% (hampir seluruhnya). Walaupun demikian masih ada siswa yang sulit menghentikan kebiasaan merokok karena mereka sudah ketagihan/kecanduan rokok walaupun mereka mengetahui akan bahaya rokok bagi kesehatan.
3. Pengaruh rokok terhadap kesehatan pada siswa SMK PUI kota Cirebon rata-rata mencapai 72,67% (sebagian besar). Hal ini membuktikan bahwa rokok telah mempengaruhi kesehatan siswa walaupun pengaruh tersebut masih dalam taraf rendah untuk dapat berakibat pada timbulnya penyakit berbahaya.
4. Korelasi antara faktor-faktor penyebab merokok dan kemauan berhenti merokok dengan pengaruh rokok terhadap kesehatan adalah berkorelasi rendah dengan nilai 0,35 yang artinya bahwa faktor-faktor dan kemauan berhenti merokok mempunyai hubungan terhadap kesehatan tubuh yang terganggu akibat merokok, walaupun korelasinya rendah.